

**1. Основные мероприятия при выведении из состояния клинической смерти**

- а) дать понюхать нашатырный спирт
- б) проведение искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
- в) проведение закрытого массажа сердца
- г) одновременное проведение ИВЛ и закрытого массажа сердца

**2. При проведении непрямого массажа сердца компрессию на грудину взрослого человека производят**

- а) всей ладонью
- б) проксимальной частью ладони
- в) тремя пальцами
- г) одним пальцем

**3. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку одним лицом**

- а) на 1 вдох - 5 компрессий
- б) на 2 вдоха - 4 компрессии
- в) на 3 вдоха - 6 компрессий
- г) на 2 вдоха - 15 компрессий

**4. При остановке сердца применяется сочетание препаратов**

- а) атропин, мезатон, гидрокарбонат натрия
- б) зуфиллин, калия хлорид, гидрокарбонат натрия
- в) адреналин, атропин, гидрокарбонат натрия, кальция хлорид
- г) кальция хлорид, лидокаин, мезатон

**5. При проведении закрытого массажа сердца поверхность, на которой лежит пациент, обязательно должна быть**

- а) жесткой
- б) мягкой
- в) наклонной
- г) неровной

**6. Тройной прием для обеспечения свободной проходимости дыхательных путей включает**

- а) положение на спине, голова повернута набок, нижняя челюсть выдвинута вперед
- б) под лопатки подложен валик, голова отогнута кзади, нижняя челюсть выдвинута вперед
- в) положение на спине, голова согнута кпереди, нижняя челюсть прижата к верхней
- г) положение на спине, под лопатки подложен валик, нижняя челюсть прижата к верхней

**7. Признак эффективности реанимационных мероприятий**

- а) отсутствие экскурсий грудной клетки
- б) зрачки широкие
- в) отсутствие пульсовой волны на сонной артерии
- г) появление пульсовой волны на сонной артерии, сужение зрачков

**8. Соотношение дыханий и компрессий на грудину при проведении реанимации взрослому человеку двумя лицами**

- а) на 1 вдох - 2 компрессии
- б) на 1 вдох - 10 компрессий

- в) на 1 вдох - 5 компрессий
- г) на 2 вдоха - 15 компрессий

**9. ИВЛ новорожденному желательно проводить**

- а) методом «изо рта в рот»
- б) с помощью маски наркозного аппарата
- в) методом «изо рта в нос»
- г) методом «изо рта в рот и нос»

**10. Продолжительность проведения аппаратной ИВЛ при реанимации, если не появляется спонтанное дыхание**

- а) 20 минут
- б) 15 минут
- в) 10 минут
- г) решается коллегиально, через несколько дней

**11. Для предупреждения западения корня языка при проведении реанимации голова пострадавшего должна быть**

- а) повернута набок
- б) запрокинута назад
- в) согнута вперед
- г) в исходном положении

**12. Продолжительность клинической смерти в условиях нормотермии**

- а) 1-2 минуты
- б) 3-5 минут
- в) 25-30 минут
- г) 8-10 минут

**13. Число дыханий в 1 минуту при проведении ИВЛ взрослому человеку**

- а) 8-10 в 1 минуту
- б) 30-32 в 1 минуту
- в) 12-20 в 1 минуту
- г) 20-24 в 1 минуту

**14. Признаки клинической смерти**

- а) потеря сознания и отсутствие пульса на сонных артериях
- б) спутанность сознания и возбуждение
- в) нитевидный пульс на сонных артериях
- г) дыхание не нарушено

**15. Основное осложнение, возникающее при проведении закрытого массажа сердца**

- а) перелом ключицы
- б) перелом ребер
- в) повреждение трахеи
- г) перелом позвоночника

**16. При проведении наружного массажа сердца ладони следует расположить**

- а) на верхней трети грудины

- б) на границе верхней и средней третей грудины
- в) на границе средней и нижней третей грудины
- г) в пятом межреберном промежутке слева

**17. Закрытый массаж сердца новорожденному проводят**

- а) кистями обеих рук
- б) четырьмя пальцами правой руки
- в) проксимальной частью кисти правой руки
- г) двумя пальцами руки

**18. Глубина продавливания грудины при проведении закрытого массажа сердца взрослому человеку**

- а) 1-2 см
- б) 4-6 см
- в) 7-8 см
- г) 9-10 см

**19. Глубина продавливания грудной клетки при проведении закрытого массажа сердца новорожденному**

- а) 1,5-2 см
- б) 4-6 см
- в) 5-6 см
- г) 7-8 см

**20. Показания к прекращению реанимации**

- а) отсутствие признаков эффективного кровообращения
- б) отсутствие самостоятельного дыхания
- в) появление признаков биологической смерти
- г) широкие зрачки

**21. Правило укладывания больного при сердечно-легочной реанимации**

- а) приподнять ножной конец
- б) приподнять головной конец
- в) положить на твердую ровную поверхность
- г) опустить головной конец

**22. Последовательность выполнения действий при проведении сердечно-легочной реанимации**

- а) ИВЛ, НМС, тройной прием
- б) тройной прием, НМС, ИВЛ
- в) ИВЛ, тройной прием, НМС
- г) тройной прием, ИВЛ+НМС

**23. Препарат, применяемый при остановке сердца**

- а) кордиамин
- б) дроперидол
- в) адреналин
- г) фуросемид

**24. Если сердечная деятельность не восстанавливается, реанимационные мероприятия можно прекратить через**

- а) 30-40 мин.
- б) 3-6 мин.
- в) 2 часа
- г) 15-20 мин.

**25. Достоверный признак биологической смерти**

- а) прекращение дыхания
- б) прекращение сердечной деятельности
- в) расширение зрачка
- г) симптом "кошачьего глаза"

### **ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ**

- 1 г,
- 2 б,
- 3 г,
- 4 в,
- 5 а,
- 6 б,
- 7 г,
- 8 в,
- 9 г,
- 10 г,
- 11 б,
- 12 б,
- 13 в,
- 14 а,
- 15 б,
- 16 в,
- 17 г,
- 18 б,
- 19 а,
- 20 в,
- 21 в,
- 22 г,
- 23 в,
- 24 а,
- 25 г.